

MYCOPLASMA HOMINIS E UREAPLASMA UREALYTICUM (Urine, Sperma, Tampone cervicale, Tampone vaginale e uretrale)

Urine:

Per effettuare l'esame, occorre avere cessato la somministrazione di antibiotici da una settimana, salvo indicazione medica.

- Procurarsi in farmacia, o laboratorio di riferimento, un contenitore sterile ad imboccatura larga per urinocoltura privo di conservanti, con tappo a vite;
- raccogliere le urine del primo getto del mattino (o almeno 2/3 ore dopo l'ultima minzione);
- lavare accuratamente mani e genitali esterni con acqua e sapone (nell'uomo, dopo avere retratto il prepuzio; nella donna, tenendo distanziate le grandi labbra);
- non toccare con le mani o i genitali i bordi o l'interno del contenitore;
- richiudere accuratamente il contenitore e consegnarlo al laboratorio nel più breve tempo possibile (se ciò non è possibile conservare in frigorifero per un massimo di 12 ore).

Sperma:

Per effettuare l'esame, occorre avere cessato la somministrazione di antibiotici da una settimana, salvo indicazione medica.

- Procurarsi in farmacia, o laboratorio di riferimento, un contenitore sterile ad imboccatura larga per urinocoltura, con tappo a vite;
- il paziente deve aver osservato astinenza dai rapporti sessuali per i 3 giorni precedenti;
- lavare accuratamente mani e pene con acqua e sapone, retraendo la cute del glande;
- indossare guanti;
- raccogliere il campione al mattino prima di aver urinato, mediante masturbazione direttamente nel contenitore (non sono accettate raccolte in preservativi o per coito interrotto, queste due procedure possono influenzare negativamente l'esito dell'esame stesso);
- non toccare con le mani o i genitali i bordi o l'interno del contenitore;
- richiudere accuratamente il contenitore e consegnarlo al laboratorio nel più breve tempo possibile (se ciò non è possibile conservare in frigorifero per un massimo di 12 ore).

Tampone cervicale, vaginale e uretrale:

Per effettuare l'esame, occorre avere cessato la somministrazione di antibiotici da una settimana, salvo indicazione medica.

Il paziente deve aver osservato astinenza dai rapporti sessuali per i 3 giorni precedenti e per il tampone uretrale non deve aver urinato nelle 2/3 ore precedenti l'esame.

Telefonare alla nostra Segreteria per appuntamento per esecuzione del tampone.